

栽培方法※	支所・生産者コード	生産者氏名	電話番号
05	026-		

※栽培方法は、5:JA米 を記入してください

確認欄 (印)	
確認 03月10日 JA松本ハイランド	印

1 品種※	作付面積(a)	2 品種※	作付面積(a)	3 品種※	作付面積(a)
5 266	28				

※品種は、5:コシヒカリ | 19:もちひかり | 26:あきたこまち | 33:風さやか を記入してください

●作業(作業月日を記入)【掲載されていない作業は空白欄内に手書きで記入してください】

1 田植え日	2 出穂日	3 落水日	4 刈取予定日	5	6	7	8
5/19	8/3	8/30	9/20				

●種子更新・田植え(対象となる項目に○を記入)

育苗方法	種子更新			
	JA委託	完全	一部	無し
	JA以外	完全	一部	無し
	自家	完全	一部	無し

田植え	
稚苗	○ 直播
中苗	その他

●その他

乾燥調製施設	
JA施設	
個人【火力】	
自家【はげ架け】	○
その他	

区分	
通常出荷	

●土壌改良剤・肥料(施肥月日、10aあたり施肥量を記入)【掲載されていない肥料は空白欄内に手書きで記入してください】

肥料名	施肥月日	施肥量	肥料名	施肥月日	施肥量
1 土づくり ハイラン土元気 20kg	11/14	80 kg	6 穂肥 BB NKC707号 20KO	7/29	10 kg
2			7 穂肥 BB 粒状固形136 20KO		
3 基肥 BB ハイランドエース21 20kg	4/30	40 kg	8 穂肥 BB NKC201号 20KO		
4 基肥 BB ハイランドシルバー 20kg			9		
5 基肥 BB 水稲ワンLPS80 20			10		

●除草・病害虫防除(散布月日、10aあたり倍数または散布量を記入)【掲載されていない農薬は空白欄内に手書きで記入してください】 ※育苗時の使用内容も漏れなく記入してください

散布時期	使用目的	農薬名	基準量	使用時期・方法	回数	1回 散布月日	倍数または散布量	2回 散布月日	倍数または散布量
1	種子消毒	殺菌剤 テクリードCフロアブル	200 倍	浸種前	1				
2	種子消毒	殺菌剤 ダコレート水和剤	800~1200 倍	は種時から緑化期 但し、は種14日後まで	2	4/18	1000 倍		
3	苗箱施薬	殺虫剤 アドマイヤーCR箱粒剤	50 g	は種時(覆土前)~移植当日	1				
4	苗箱施薬	殺虫剤 ダントツ粒剤	50 g	移植3日前~移植当日	1				
5	苗箱施薬	殺虫殺菌剤 デジタルミネクト箱粒剤	50 g	移植3日前~移植当日	1	5/19	50 g		
6	苗箱施薬	殺虫殺菌剤 ルーチンデュオ箱粒剤	50 g	は種時(覆土前)~移植当日	1				
7	初期剤	除草剤 ピラクロンフロアブル	500 ml	移植後~移植後7日前又は移植直後~トイ1.5葉期 但し、移植後30日まで	1				
8	初期剤	除草剤 クリアホープフロアブル	500 ml	移植後~移植前7日又は移植直後~トイ1葉期 但し、移植後30日まで	1				
9	初期剤	除草剤 クマイサイキドリEW	500 ml	移植後~移植前7日又は移植直後~トイ1葉期 但し、移植後30日まで	1				
10	初期剤	除草剤 ショキニー250グラム	250 g	移植後1日~トイ1葉期 但し、移植後30日まで	1				
11	初中期剤	除草剤 バッチリLXフロアブル	500 ml	移植直後~トイ2.5葉期 但し、移植後30日まで	1				
12	初中期剤	除草剤 アツパレZフロアブル	500 ml	移植後3日~トイ3葉期 但し、移植後30日まで	1	5/27	500 ml		
13	初中期剤	除草剤 カウントダウンフロアブル	500 ml	移植直後~トイ3.5葉期 但し、移植後30日まで	1				
14	初中期剤	除草剤 アシユラフロアブル	500 ml	移植直後~トイ4葉期 但し、移植後30日まで	1				
15	初中期剤	除草剤 カウントダウンジャンボ	400 g	移植直後~トイ3葉期 但し、移植後30日まで	1				
16	初中期剤	除草剤 カイリキZジャンボ	300 g	移植後3日~トイ3葉期 但し、移植後30日まで	1				
17	初中期剤	除草剤 アールタイプジャンボ	400 g	移植後3日~トイ2.5葉期 但し、移植後30日まで	1				
18	初中期剤	除草剤 ベッカク豆つぶ250	250 g	移植後3日~トイ3葉期 但し、移植後30日まで	1				
19	いもち病	殺菌剤 コラトップ粒剤5	3~4 kg	葉いもちに対しては初発10日前~初発時穂いもちに対しては出穂30日前~5日前まで	2				
20	いもち病	殺菌剤 フジワン粒剤	3~5 kg	葉いもちに対しては初発10日前 穂いもちに対しては出穂10~30日前 但し、収穫30日前まで	2				
21	いもち病	殺菌剤 コラトップジャンボP	500~650 g	葉いもちに対しては初発20日前~初発時 穂いもちに対しては出穂30日前~5日前まで	2				
22	いもち病	殺菌剤 オリブライト250G	250 g	出穂10日前まで 但し、収穫45日前まで	1				
23		農将軍 500ml	500ml			5/19	500ml		
24									
25									
26									

コピー厳禁 !!

特記事項 このシートは 2020年12月01日 現在の基準に基づいて作成されました。